

## HELICOBACTER PYLORI ACTUALITES

*Helicobacter pylori* est une bactérie impliquée dans la genèse et l'entretien des ulcères. On considère qu'elle est responsable de 7/10 ulcères gastriques et de 9/10 ulcères duodénaux. Le traitement bactérien éradiquant la bactérie va donc permettre de traiter l'infection et de prévenir les rechutes. Dans environ 1% des cas l'infection peut évoluer vers un cancer gastrique.


### INDICATIONS DE LA RECHERCHE D'*Helicobacter pylori*

- Ulcère gastroduodéal actif ou ancien
- lymphome de MALT
- Dyspepsie non ulcéreuse (après exploration endoscopique)
- Mise au traitement par AINS ou aspirine faible dose au long cours
- ATCD d'ulcère et prise d'AINS ou aspirine faible dose
- Traitement au long cours par IPP
- Avant by pass gastrique
- Carence en fer sans étiologie retrouvée, en vit B12, PTI
- ATCD personnel ou familial de cancer gastrique
- Lésions pré néoplasiques gastriques : atrophie +/- métaplasie



TEST	INDICATIONS	INCONVENIENTS
Test respiratoire à l'urée <sup>13</sup> C	Diagnostic initial de l'infection	Délai de 4 semaines sans antibiotiques
	Contrôle de l'éradication	Délai de 2 semaines sans IPP
Sérologie <i>Helicobacter pylori</i>	Diagnostic initial de l'infection en cas de prise d'IPP ou d'antibiotiques récente	Inutile en contrôle d'éradication, sérologie positive plusieurs mois ou année après l'infection
Biopsies gastriques (2 antrales/1 angulus/2 fundiques)	Diagnostic initial et lésions associées	Délai de 4 semaines sans antibiotiques
	Culture ou PCR pour étudier les résistances	Délai de 2 semaines sans IPP

# PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE DE L'INFECTION A *Helicobacter pylori*



## TRAITEMENT SEQUENTIEL : 10 JOURS

Les 5 premiers jours :

- IPP matin et soir
- Amoxicilline 1gr matin et soir

Les 5 jours suivants :

- IPP matin et soir
- Métronidazole 500mg matin et soir
- Clarithromycine 500mg matin et soir

## QUADRITHERAPIE BISMUTHEE : 10 JOURS

3 gelules 4 fois/jour (après petit-déjeuner, déjeuner, dîner et coucher) et Oméprazole 20mg matin et soir

## REALISATION D'UN TEST RESPIRATOIRE A L'UREE<sup>13</sup>C

2 ordonnances remises au patient :

- pour la pharmacie : **Test respiratoire à l'urée<sup>13</sup>C**
- pour le laboratoire : **Recueil et analyse de l'air expiré**

Conditions :

- 1- Etre à jeun
- 2- Arrêt des antibiotiques depuis au moins 4 semaines
- 3- Arrêt des IPP depuis au moins 2 semaines
- 4- Pansements gastriques arrêtés 24 h avant le test
- 5- Deux recueils de l'air expiré à 30 mn d'intervalle

### Pour en savoir plus :

[www.helicobacter.fr](http://www.helicobacter.fr), site du Groupe d'étude Français des *Helicobacter* (GEFH)

Dépistage de l'infection à *Helicobacter pylori* : pertinence et populations concernées, recommandations en santé publique, Haute autorité de santé, avril 2010

Lamarque D, Burucoa C, Courillon-Mallet A, de Korwin JD, Delchier JC, Fauchere JL, Kalach N, Labigne A, Lehours P, Megraud F, Raymond J ; Révision des recommandations françaises sur la prise en charge de l'infection par *Helicobacter pylori*, Hepato Gastro 2012